

# ЭНТЕРОБИОЗ

Энтеробиоз - паразитарное заболевание человека, характеризующееся поражением кишечника, зудом вокруг анального отверстия и аллергизацией организма.

Возбудитель энтеробиоза — остирица. Это круглый гельминт серовато-белого цвета длина не превышает 1 см. Живые остирицы могут ползти или извиваться, ведут ночной образ жизни. Остирицы паразитируют в нижней половине тонких кишок, слепой кишке и в начальной части ободочной кишки. Самки остириц спускаются в прямую кишку, активно выходят из заднего прохода, откладывают яйца в его окружности и погибают. Общая продолжительность жизни остириц в организме человека не свыше 3-4 недель.

Источником заражения является только больной энтеробиозом. Яйца, отложенные самками остириц на коже больного, уже через 4-6 часов созревают и становятся заразными. Они попадают на нательное и постельное белье больного, предметы домашнего обихода. Заражение человека происходит при проглатывании зрелых яиц остириц с продуктами питания и при заносе их в рот и нос вместе с пылью. У больных энтеробиозом весьма часто происходит самозаражение, расчесывая или трогая кожу при зуде в области заднепроходного отверстия, происходит загрязнение пальцев рук и повторное попадание гельмinta в кишечник.

Внедряясь и присасываясь к слизистой оболочке кишечника, гельминты вызывают механические повреждения, в результате возникает воспалительный процесс. Продукты обмена веществ гельмитов вызывают сенсибилизацию организма с развитием аллергии.

**Симптомы:** период от момента заражения до появления симптомов составляет 12 - 14 дней. Основной симптом — зуд в области заднего прохода по ночам, продолжающийся по несколько дней и повторяющийся через 3-4 недели.

При наличии в кишечнике больного большого количества остириц и при массивной повторной инвазии зуд становится постоянным и очень мучительным. Нередко возникает тошнота, потеря аппетита, сухость во рту, схваткообразные боли в животе, иногда понос со слизью. Отмечается головная боль, головокружение, бессонница, ухудшение памяти, рассеянность, у детей могут быть судорожные припадки.

Лечение эффективно при тщательном соблюдении больным личной гигиены и одновременном лечении всех членов семьи, а в детском коллективе — всех инвазированных детей и персонала.

В квартире нужно провести гигиенические мероприятия: прокипятить в течение получаса и прогладить с двух сторон все постельное и личное белье, провести влажную уборку с использованием моющих средств, особенно уделить внимание уборной, прихожей и дверным ручкам, помыть с мылом все игрушки, пропылесосить ковры, повторить весь комплекс обеззараживания через 2 недели.

